

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Informácie pre použitie, čítajte pozorne!

Coldrex® Broncho proti kašľu

Sirup

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia

Výrobca: Wrafton Laboratories Ltd., Wrafton, Braunton, North Devon, Veľká Británia

Zloženie lieku:

Liečivá: guaifenesinum (guaifenezín) 100 mg, amyllum hydrolysatum liquidum (tekutý hydrolyzovaný škrob) 3,00 g, sirupus communis (obyčajný sirup) 1,35 g v 5 ml sirupu.

Pomocné látky: macrogolum 300 (makrogol 300), acidum aceticum glaciale (ľadová kyselina octová), natrii benzoas (benzoan sodný), capsici tinctura (kapsicínová tinktúra), natrii disulfis (disiričitan sodný), anisi etheroleum (anízová silica), xanthani gummi (xantánová guma), camphora racemica (racemický gáfor), natrii cyclamas (nátriumcyclamát), acesulfamum kalicum (draselná soľ acesulfámu), aroma liguritiiae et anisi fructus (príchut' sladkého driebka a anízu), saccharum tostum (karamel), levomentholum (levomentol), aqua purificata (čistená voda).

Jedna dávka 5 ml obsahuje 3,6 g cukru a 4,8 mg sodíka.

Farmakoterapeutická skupina: expektorans, sekretolytikum.

Charakteristika: Coldrex Broncho Proti kašľu je určený na úľavu od kašľa (prieduškový kašeľ) a na uľahčenie odkašliavania pri akútnom zápale priedušiek so zahlienením, pri chrípke a prechladnutí. Obsahuje tri účinné látky.

Guaifenezín je expektorans, zložka lieku, ktorá zvyšuje tvorbu tekutého hlienu, a tým uľahčuje odkašliavanie.

Obyčajný sirup (sirupus communis) a tekutý hydrolyzovaný škrob (amyllum hydrolysatum liquidum) sú látky, ktoré upokojujú dráždenie v krku sprevádzajúce zápal hrdla.

Indikácie: Coldrex Broncho Proti kašľu sirup je určený na úľavu od kašľa (prieduškový kašeľ) a na uľahčenie odkašliavania pri akútnom zápale priedušiek. Súčasne upokojuje dráždivý pocit v krku sprevádzajúci zápal hrdla. Je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Kontraindikácie: Liek sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na guaifenezín alebo ďalšie zložky lieku, pri porfýrii a pri myasthenia gravis.

Nežiaduce účinky: Nežiaduce účinky sú u tohto lieku pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania a spôsobe užívania výnimočné. Niekedy sa môžu objaviť po guaifenezíne tráviace ťažkosti (nevoľnosť, zvracanie) a kožná vyrážka, ktoré sú však prechodné a ustúpia, keď liek prestanete užívať.

V prípade, že ťažkosti pretrvávajú alebo sa objavia nové príznaky, liek ďalej neužívajte a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Interakcie: Závažné vzájomné reakcie liekov s guaifenezínom sú vzácne. K zosilneniu účinku môže dôjsť pri súčasnom podávaní tohto lieku s liekmi, ktoré tlmia činnosť CNS, s myorelaxanciami, antihistaminikami a alkoholom.

Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a deti od 12 rokov: 1 dávka 10 ml sa užíva podľa potreby opakovane každé 2-3 hodiny (odmerku naplniť po značku 10 ml). Maximum je 6 dávok počas 24 hodín.

Deti od 6 do 12 rokov: 1 dávka 5 ml sa podáva podľa potreby opakovane každé 2-3 hodiny (odmerku naplniť po značku 5 ml). Maximum je 6 dávok počas 24 hodín.

Upozornenie: Liek sa zvyčajne podáva 7 dní. V prípade, že sa po 5 dňoch u dospelých a po 2 dňoch u detí príznaky nezlepšia alebo sa objavia nové ťažkosti, poraďte sa s lekárom. Počas tehotenstva a dojčenia možno liek užívať len po predchádzajúcom súhlase lekára. Počas liečby týmto liekom nepite alkohol. Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť (napr. vedenie motorových vozidiel, práca vo výškach). Pri vykašliavaní riedkeho hlienu nie je podávanie lieku účinné.

Uchovávanie: Uchovávajúte pri teplote do 30°C.

Varovanie: Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Liek uschovávajúte mimo dosahu detí.

Balenie: 100 alebo 160 ml sirupu

Dátum poslednej revízie textu: Február 2006