

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Informácie pre použitie, čítajte pozorne!

Panadol® Femina

Filmom obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia

Výrobca: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, S.A., ul. Grunwaldzka, Poznań, Poľsko

Zloženie

Liečivá: paracetamol (paracetamol) 500 mg, butylscopolaminii bromidum (butylskopolamínium-bromid) 10 mg v 1 tablete.

Pomocné látky: cellulose microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), solani amyli (zemiakový škrob), povidonum (povidón), sorbitolum (sorbitol), talcum (mastenec), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý bezvodý), carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), hypromellosum (hypromelóza), macrogolum (makrogol) 6000.

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, spazmolytikum, antipyretikum

Kedy sa tablety Panadol Femina užívajú?

Panadol Femina filmom obalené tablety prinášajú rýchlu a účinnú úľavu od menštruačných bolestí a kŕčov.

Ako Panadol Femina pôsobí?

Panadol Femina obsahuje dve liečivá: paracetamol – analgetikum (liek proti bolesti) a butylskopolamíniumbromid – spazmolytikum (liek proti menštruačným kŕčom). Výsledkom tejto kombinácie je súčasné pôsobenie oboch liečivých látok proti menštruačným bolestiam a kŕčom. Nedráždi žalúdok. Štíhly tvar filmom obalených tabliet umožňuje ich ľahké prehĺtanie.

Pred užitím skontrolujte:

Neužívajte liek súčasne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol. Panadol Femina neužívajte pri známej precitlivenosti na paracetamol, butylskopolamíniumbromid alebo akúkoľvek inú zložku lieku.

Pred užitím Panadolu Femina sa poraďte s lekárom pokiaľ:

- Máte závažné obličkové, pečenevé alebo srdcové ochorenia.
- Užívate metoklopramid, domperidón a disopyramid (liek proti nevoľnosti a zvracaniu) alebo cholestyramín (liek na zníženie zvýšenej hladiny cholesterolu).
- Užívate antidepresíva, antihistaminiká (lieky proti niektorým alergickým reakciám), chinidín (antiarytmikum), amantadín (liek proti Parkinsonovej chorobe).
- Trpíte spätným návratom štiav tráviaceho traktu, myasthenia gravis, vredmi alebo zápchou.

Ako sa Panadol Femina užíva?

Dospelí a deti nad 12 rokov: 1-2 filmom obalené tablety až 3x denne. Jednotlivé dávky opakujte najskôr po 8 hodinách. Maximálna denná dávka je 6 filmom obalených tabliet. Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov. Liek je určený na vnútorné užitie. V prípade, že príznaky pretrvávajú, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Pri užití vyšších dávok ako dávok odporúčaných môže dôjsť k závažnému poškodeniu funkcie pečene. V týchto prípadoch je potrebné sa poradiť s lekárom, aj keď nemáte žiadne ťažkosti.

Aké sú možné nežiaduce účinky Panadolu Femina?

Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé. Môže sa objaviť kožná alergická reakcia (sčervenanie, vyrážka). K nežiaducim účinkom butylskopolamíniumbromidu patria sucho v ústach, dezorientácia, poruchy pamäti, závraty a poruchy zrakovej ostrosti alebo bolesti v očnej buľve. Tieto nežiaduce účinky sú vzácne, pokiaľ sa však objavia, prerušte užívanie lieku a poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom. Panadol Femina môže spôsobiť poruchu ostrosti videnia, preto sa vedenie motorových

vozidiel a obsluha strojov neodporúča. Pri predpisovaní iných liekov je potrebné informovať lekára, že užívate liek Panadol Femina filmom obalené tablety.

Uchovávanie: Uschovávajúte pri teplote do 25°C.

Varovanie: Používajte len do času použiteľnosti vyznačenom na obale. Liek uložte mimo dosahu detí.

Balenie: 6, 8, 10, 12, 16, 20 a 30 filmom obalených tabliet

Panadol je registrovaná ochranná známka skupiny firiem GlaxoSmithKline.

Dátum poslednej revízie textu: Február 2005